

**Inzenden scores**

Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in het programma Wolf.  
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar de Citogroep.

## 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het procesverbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past bij zijn beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.

2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.

4 De examinerator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

## 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van toepassing:

1 De examinerator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinerator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.

Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:

3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;

3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het antwoordmodel;

3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;

3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord.

4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

6 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een toets of in het antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.

Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.

Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

7 Voor deze toets kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

8 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.

Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.

De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO).

Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan worden.

### **3 Vakspecifieke regels**

Voor het vak Wiskunde A1 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken.

## 4 Antwoordmodel

Antwoorden	Deel-scores
------------	-------------

### Levensduur van koffiezetapparaten

#### Maximumscore 4

- |   |          |
|---|----------|
| 1 <input type="checkbox"/> • Na 2,5 jaar zijn er $1500 \cdot 0,99 \cdot 0,97$ apparaten | <u>1</u> |
| • Na 3,5 jaar zijn er $1500 \cdot 0,99 \cdot 0,97 \cdot 0,87$ apparaten                 | <u>1</u> |
| • Het verschil hiertussen bedraagt 187 apparaten  | <u>2</u> |
| of  |          |
| • de kansen 0,99 en 0,97  | <u>1</u> |
| • de kans $1 - 0,87 = 0,13$   | <u>1</u> |
| • de berekening $0,99 \cdot 0,97 \cdot 0,13$  | <u>1</u> |
| • Dit levert, uitgaande van 1500 apparaten, 187 koffiezetapparaten                      | <u>1</u> |

#### Maximumscore 7

- |   |           |
|---|-----------|
| 2 <input type="checkbox"/> • de berekening van de cumulatieve percentages:<br>1,0; 4,0; 16,5; 37,3; 62,4; 82,7; 93,6; 99,0 (en 100) | <u>2</u>  |
| • het correct aangeven van de punten op normaal waarschijnlijkheidspapier   | <u>2</u>  |
| • Deze punten liggen nagenoeg op een rechte lijn  | <u>1</u>  |
| • het gemiddelde aflezen met behulp van de 50%-lijn   | <u>1</u>  |
| • de standaardafwijking aflezen met behulp van bijvoorbeeld een vuistregel van de normale verdeling                                 | <u>1</u>  |
| Indien de punten niet bij de rechter klassengrenzen zijn aangegeven   | <u>-1</u> |
| Indien het gemiddelde en de standaardafwijking berekend zijn met een tabel met klassenmiddens                                       | <u>-0</u> |

#### Maximumscore 5

- |  |          |
|--|----------|
| 3 <input type="checkbox"/> • het invoeren van de juiste parameters bij de cumulatieve normale verdeling in de GR | <u>2</u> |
| • $P(X \leq 3) \approx 0,1056$   | <u>1</u> |
| • De gevraagde kans is $0,1056^3 \approx 0,0012$   | <u>2</u> |
| of   |          |
| • $z = \frac{3-5}{1,6} = -1,25$  | <u>2</u> |
| • het opzoeken in de tabel van $P(Z \leq -1,25) = 0,1056$  | <u>1</u> |
| • De gevraagde kans is $0,1056^3 \approx 0,0012$   | <u>2</u> |

#### Maximumscore 3

- |  |          |
|--|----------|
| 4 <input type="checkbox"/> • De apparaten uit 1993 waren begin januari 1997 gemiddeld 3,5 jaar oud | <u>1</u> |
| • Een jaar later zijn nog $506 - 125 = 381$ van deze apparaten in gebruik                          | <u>1</u> |
| • $\frac{381}{506} \approx 0,75$ is de kans van 3,5 naar 4,5 jaar in figuur 1                      | <u>1</u> |

### De Nederlandse bevolking

#### Maximumscore 4

- |   |          |
|---|----------|
| 5 <input type="checkbox"/> • De groeifactor in 74 jaar is $\frac{13,4}{5} = 2,68$ | <u>1</u> |
| • De groeifactor in 10 jaar is $2,68^{\frac{1}{7,4}} \approx 1,142$               | <u>1</u> |
| • Op $t = 0$ geldt: $N = 5$   | <u>1</u> |
| • De formule voor $N$ is dus $N = 5 \cdot 1,142^t$                                | <u>1</u> |

Antwoorden	Deel-scores
<b>Maximumscore 3</b>	
6 <input type="checkbox"/> • Volgens de grafiek is in 1945 het aantal 9 000 000	<u>1</u>
• Volgens de formule is in 1945 het aantal 9 088 000	<u>1</u>
• Het verschil tussen deze getallen is ruim 80 000	<u>1</u>
<b>Maximumscore 4</b>	
7 <input type="checkbox"/> • het opstellen van de vergelijking $5 \cdot 1,142^t = 18$	<u>1</u>
• het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om de vergelijking op te lossen	<u>1</u>
• $t \approx 9,6$	<u>1</u>
• Dat is het jaar 1996	<u>1</u>
<b>Maximumscore 4</b>	
8 <input type="checkbox"/> • De groeifactor per 10 jaar is 1,142	<u>1</u>
• De groeifactor per 5 jaar is $1,142^{\frac{1}{2}} \approx 1,069$	<u>1</u>
• Het groeipercentage in 5 jaar is dus 6,9	<u>1</u>
• Het gaat dus om mogelijkheid B	<u>1</u>
<b>Reislust</b>	
<b>Maximumscore 3</b>	
9 <input type="checkbox"/> • De opbrengst bij 25 deelnemers is 43 750 (euro)	<u>1</u>
• De opbrengst bij 26 deelnemers is 45 240 (euro)	<u>1</u>
• Reislust ontvangt bij deze ene extra deelnemer dus 1490 euro meer	<u>1</u>
of	
• De nieuwe deelnemer betaalt $2000 - 26 \cdot 10 = 1740$ (euro)	<u>1</u>
• De andere deelnemers betalen elk 10 euro minder	<u>1</u>
• De extra opbrengst is daarmee $1740 - 250 = 1490$ (euro)	<u>1</u>
<b>Maximumscore 3</b>	
10 <input type="checkbox"/> • De opbrengst per deelnemer is bij $n$ deelnemers $2000 - 10n$	<u>1</u>
• De totale opbrengst voor Reislust is $(2000 - 10n)n$ (of $2000n - 10n^2$ )	<u>2</u>
<b>Maximumscore 4</b>	
11 <input type="checkbox"/> • het opstellen van de betrekking $a_n = n$	<u>1</u>
• het invoeren van deze betrekking met de som in de GR	<u>1</u>
• De som moet groter dan 1000 zijn	<u>1</u>
• $n$ is ten minste 45	<u>1</u>
of	
• $1 + 2 + 3 + \dots + n$ is gelijk aan $\frac{1}{2}n(n+1)$	<u>2</u>
• $\frac{1}{2}n(n+1) > 1000$	<u>1</u>
• $n$ is ten minste 45	<u>1</u>
of	
• $2000 - 1 - 2 - 3 - \dots - 44 = 1010$	<u>2</u>
• $2000 - 1 - 2 - 3 - \dots - 45 = 965$	<u>1</u>
• $n$ is ten minste 45	<u>1</u>
<b>Maximumscore 3</b>	
12 <input type="checkbox"/> • De prijs per persoon bij 52 deelnemers is 622 (euro)	<u>1</u>
• De opbrengst bij 52 deelnemers is 32 344 (euro)	<u>1</u>
• Reislust ontvangt bij 52 deelnemers 2187 euro meer	<u>1</u>

Antwoorden	Deel-scores
------------	-------------

**Maximumscore 3**

- 13  • het invoeren in de GR van de functie  $T(n)$  en het instellen van een geschikt venster of gebied 1  
 • het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om het maximum van  $T(n)$  te vinden 1  
 •  $T(n)$  is maximaal als  $n = 51$  1

**Strike it rich**

**Maximumscore 3**

- 14  • het gebruik van de GR, ingesteld op de binomiale verdeling met  $n = 10$ ,  $p = \frac{1}{3}$  en  $x = 1$  2  
 • het antwoord 0,0867 1  
 of  
 •  $P = \binom{10}{1} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^9 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^1$  2  
 • het antwoord 0,0867 1

*Opmerking*

*Als de factor  $\binom{10}{1}$  bij bovenstaande werkwijze niet vermeld is, ten hoogste 1 punt voor deze vraag toekennen.*

**Maximumscore 3**

- 15  •  $P(\text{strafpunt}) = P(\text{Hot Spot}) + P(\text{Vraag}) \cdot P(\text{fout antwoord})$  2  
 •  $P(\text{strafpunt}) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  1

**Maximumscore 3**

- 16  • het gebruik van de GR, ingesteld op de cumulatieve binomiale verdeling met  $n = 10$ ,  $p = \frac{1}{2}$  en  $X \leq 2$  2  
 • het antwoord 0,0547 1  
 of  
 •  $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$  1  
 •  $P(X = 0) = 0,5^{10}$ ;  $P(X = 1) = \binom{10}{1} \cdot 0,5^9 \cdot 0,5$  en  $P(X = 2) = \binom{10}{2} \cdot 0,5^8 \cdot 0,5^2$  1  
 • het antwoord 0,0547 1

**Maximumscore 6**

- 17  • met de cumulatieve binomiale verdeling voor  $n = 10$  en  $p = \frac{1}{3}$  vaststellen dat  $P(X \leq 2) \approx 0,2991$  en  $P(X \leq 3) \approx 0,5593$  en  $P(X \leq 4) \approx 0,7869$  2

Als de deelnemer voor maximaal 2, 3 of 4 strafpunten speelt, is de winstverwachting:

- $\pounds 10\,000 \cdot 0,2991 = \pounds 2991$  (of  $\pounds 2991,41$ ) 1
- $\pounds 7000 \cdot 0,5593 = \pounds 3915,10$  (of  $\pounds 3915$  of  $\pounds 3914,85$ ) 1
- $\pounds 5000 \cdot 0,7869 = \pounds 3934,50$  (of  $\pounds 3935$  of  $\pounds 3934,36$ ) 1
- de conclusie: de deelnemer moet spelen voor een maximum van 4 strafpunten 1

**Sportprestaties**

**Maximumscore 4**

- |  |          |
|--|----------|
| 18 <input type="checkbox"/> • 8 minuten en 25 seconden is 505 seconden | <u>1</u> |
| • punten van de man: $P = \frac{1077300}{505} - 1234,9 \approx 898,4$  | <u>1</u> |
| • punten van de vrouw: $P = \frac{1197450}{505} - 1176 \approx 1195,2$ | <u>1</u> |
| • Het verschil bedraagt (ongeveer) 296,8 punten                        | <u>1</u> |

**Maximumscore 3**

- |  |          |
|--|----------|
| 19 <input type="checkbox"/> • het opstellen van de vergelijking $880,2 = \frac{111960}{t} - 1433,5$                      | <u>1</u> |
| • $\frac{111960}{t} = 2313,7$ (of het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om bovenstaande vergelijking op te lossen) | <u>1</u> |
| • $t = 48,39$  | <u>1</u> |

**Maximumscore 4**

- |   |          |
|---|----------|
| 20 <input type="checkbox"/> • het opstellen van $224,8\sqrt{r} - 686,5 = 0$ of $224,8\sqrt{r} - 686,5 \geq 0$ | <u>1</u> |
| • $\sqrt{r} = \frac{686,5}{224,8}$ ( $\approx 3,05$ )   | <u>1</u> |
| • $r \approx 9,33$ (of 9,30)  | <u>1</u> |
| • de conclusie: een vrouw moet minstens 9,33 m (of 9,30 m) werpen   | <u>1</u> |
| of  |          |
| • het opstellen van $224,8\sqrt{r} - 686,5 = 0$ of $224,8\sqrt{r} - 686,5 \geq 0$                             | <u>1</u> |
| • het aangeven hoe de GR moet worden gebruikt om de vergelijking/ongelijkheid op te lossen                    | <u>1</u> |
| • $r \approx 9,33$  | <u>1</u> |
| • de conclusie: een vrouw moet minstens 9,33 m werpen   | <u>1</u> |

**Maximumscore 5**

- |   |          |
|---|----------|
| 21 <input type="checkbox"/> • het invoeren in de GR van $P = 190,2\sqrt{r} - 711,3$ en $P = 10,14 \cdot (r - 7)^{1,08}$ en het instellen van een geschikt venster | <u>2</u> |
| • het vaststellen dat er bij $r \approx 23,27$ een snijpunt is  | <u>1</u> |
| • het vaststellen dat er ook bij $r \approx 67,38$ een snijpunt is  | <u>1</u> |
| • de conclusie met behulp van de grafieken op de GR: $23,27 < r < 67,38$  | <u>1</u> |

**Maximumscore 3**

- |   |          |
|---|----------|
| 22 <input type="checkbox"/> • $a = 0,14354 \cdot 100^{1,4}$ | <u>2</u> |
| • het antwoord 90,57  | <u>1</u> |

**Einde**