

Correctievoorschrift VWO

2008

tijdvak 2

wiskunde B1

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Inzenden scores

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de *Regeling beoordeling centraal examen* vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002).

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de gecommiteerde toekomen.
- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de CEVO.

- 4 De examiner en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-regeling van toepassing:

- 1 De examiner vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examiner en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
 - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
 - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
 - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
 - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
 - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
 - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
 - 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
 - 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, hoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
 - 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
- 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
- 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
- 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen kunnen maximaal 84 scorepunten worden behaald.

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout of verschrijving in de berekening wordt één punt afgetrokken tot het maximum van het aantal punten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij de vragen waarbij de kandidaten de Grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen doen de kandidaten er verslag van hoe zij de GR gebruiken.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Een exponentiële functie

1 maximumscore 4

- $f'(x) = -2e^{-2x}$ 1
- $f'(0) = -2$ 1
- $f(0) = 1$, dus een vergelijking van de raaklijn is $y = -2x + 1$ 1
- De x -coördinaat van B is $\frac{1}{2}$ 1

2 maximumscore 5

- De oppervlakte van het vlakdeel is gelijk aan $\int_0^p e^{-2x} dx$ 1
- Een primitieve van e^{-2x} is $F(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}$ 1
- De oppervlakte van het vlakdeel is $-\frac{1}{2}e^{-2p} + \frac{1}{2}$ 1
- e^{-2p} is positief (voor elke positieve waarde van p) 1
- Dus $-\frac{1}{2}e^{-2p} + \frac{1}{2}$ is kleiner dan $\frac{1}{2}$ voor elke positieve waarde van p 1

3 maximumscore 6

- De beeldgrafiek is de grafiek van een functie g die gedefinieerd is als $g(x) = e^{-2x} - a$ 1
- $e^{-2x} - a = 0$ geeft $-2x = \ln a$ 1
- De x -coördinaat van het snijpunt met de x -as is $-\frac{1}{2} \ln a$ 1
- De y -coördinaat van het snijpunt met de y -as is $1 - a$, dus $1 - a = -\frac{1}{2} \ln a$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Het antwoord: $a \approx 0,20$ 1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Looptijden

4 maximumscore 5

- Bij een gemiddelde snelheid van 5,0 km/uur doet hij 25,2 minuten over de wandeling 1
- Te berekenen is de kans $P(T < 25,2 \mid \mu = 28 \text{ en } \sigma = 2,5)$ 1
- Beschrijven hoe deze kans berekend kan worden 1
- $P(T < 25,2) \approx 0,1314$ 1
- Het antwoord: $7 \cdot 0,1314 \approx 0,92$ dagen per week (of ongeveer 1 dag per week) 1

5 maximumscore 5

- Bijvoorbeeld $a = 0,5$ kiezen geeft de te berekenen kansen $P(v < 4,0)$ en $P(v > 5,0)$ 1
- $P(v < 4,0) = P(T > 31,5 \mid \mu = 28 \text{ en } \sigma = 2,5)$ en $P(v > 5,0) = P(T < 25,2 \mid \mu = 28 \text{ en } \sigma = 2,5)$ 1
- Beschrijven hoe deze kansen berekend kunnen worden 1
- $P(v < 4,0) = P(T > 31,5) \approx 0,0808$ en $P(v > 5,0) = P(T < 25,2) \approx 0,1314$ 1
- Deze kansen zijn niet gelijk aan elkaar (dus het vermoeden is niet juist) 1

Een zwaartepunt

6 maximumscore 6

- $x \cdot (f(x))^2 = x(1-x^2) = x - x^3$ 2
- Een primitieve van $x - x^3$ is $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4$ 1
- $\int_0^1 x \cdot (f(x))^2 dx = \frac{1}{4}$ 1
- $V = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi = \frac{2}{3} \pi$ 1
- $x_Z = \frac{\frac{1}{4} \pi}{\frac{2}{3} \pi} = \frac{3}{8} (= 0,375)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Rechthoek in ovaal

7 maximumscore 4

- $AB = 2 \cos \alpha + 2$ en $AD = 2 \sin \alpha$ 2
- De oppervlakte van $ABCD$ is $(2 \cos \alpha + 2) \cdot 2 \sin \alpha = 4 \sin \alpha \cos \alpha + 4 \sin \alpha$ 1
- $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$, dus $O = 2 \sin 2\alpha + 4 \sin \alpha$ 1

of

- $AD = 2 \sin \alpha$, dus de rechthoek binnen het vierkant heeft oppervlakte $4 \sin \alpha$ 2
- De twee rechthoeken aan de zijkanten hebben elk oppervlakte $2 \sin \alpha \cos \alpha$ 1
- $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$, dus $O = 2 \sin 2\alpha + 4 \sin \alpha$ 1

8 maximumscore 4

- $\frac{dO}{d\alpha} = 4 \cos 2\alpha + 4 \cos \alpha$ 2
- $\frac{dO}{d\alpha} = 4(\cos 2\alpha + \cos \alpha) = 4(2 \cdot \cos \frac{2\alpha+\alpha}{2} \cdot \cos \frac{2\alpha-\alpha}{2}) = 8 \cdot \cos 1\frac{1}{2}\alpha \cdot \cos \frac{1}{2}\alpha$ 2

9 maximumscore 4

- $\frac{dO}{d\alpha} = 0$ als $\cos 1\frac{1}{2}\alpha = 0$ of $\cos \frac{1}{2}\alpha = 0$ 1
- $\cos 1\frac{1}{2}\alpha = 0$ geeft $\alpha = \frac{1}{3}\pi$ (of $\alpha \approx 1,047$) (en $\cos \frac{1}{2}\alpha = 0$ heeft geen oplossing voor $0 < \alpha < \frac{1}{2}\pi$) 2
- De maximale oppervlakte is $3\sqrt{3}$ (of ongeveer 5,2) 1

of

- $\frac{dO}{d\alpha} = 0$ als $4 \cos 2\alpha + 4 \cos \alpha = 0$, dus $4(2 \cos^2 \alpha - 1) + 4 \cos \alpha = 0$ 1
- $8 \cos^2 \alpha + 4 \cos \alpha - 4 = 0$ geeft $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ (of $\cos \alpha = -1$) 1
- $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ geeft $\alpha = \frac{1}{3}\pi$ (of $\alpha \approx 1,047$) (en $\cos \alpha = -1$ heeft geen oplossing voor $0 < \alpha < \frac{1}{2}\pi$) 1
- De maximale oppervlakte is $3\sqrt{3}$ (of ongeveer 5,2) 1

of

- $\frac{dO}{d\alpha} = 0$ als $4 \cos 2\alpha + 4 \cos \alpha = 0$, dus $\cos 2\alpha = -\cos \alpha$ 1
- $\cos 2\alpha = -\cos \alpha$ geeft $2\alpha = \pi - \alpha + k \cdot 2\pi$ of $2\alpha = \pi + \alpha + k \cdot 2\pi$ 1
- $2\alpha = \pi - \alpha + k \cdot 2\pi$ geeft $\alpha = \frac{1}{3}\pi$ (of $\alpha \approx 1,047$) (en $2\alpha = \pi + \alpha + k \cdot 2\pi$ heeft geen oplossing voor $0 < \alpha < \frac{1}{2}\pi$) 1
- De maximale oppervlakte is $3\sqrt{3}$ (of ongeveer 5,2) 1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Een dobbelspel

- 10 maximumscore 3**
- K moet met de ene dobbelsteen een stip werpen en met de andere dobbelsteen een A, of omgekeerd 1
 - De kans op één van die volgordes is $\frac{4}{6} \cdot \frac{1}{6}$ 1
 - De kans is $2 \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{9}$ 1
- 11 maximumscore 4**
- Dat kan alleen als L zijn fiche niet kwijt raakt en vervolgens K zijn beide fiches wel kwijt raakt 1
 - De kans dat L zijn fiche niet kwijt raakt, is $\frac{4}{6}$ 1
 - De kans dat K zijn fiches kwijt raakt, is $\left(\frac{2}{6}\right)^2$ 1
 - De gevraagde kans is $\frac{4}{6} \cdot \left(\frac{2}{6}\right)^2 = \frac{2}{27}$ (of ongeveer 0,074) 1
- 12 maximumscore 6**
- Het aantal keer X dat K wint, is binomiaal verdeeld met $n = 10$ en $p = 0,43$ 1
 - Het aantal keer Y dat L wint, is binomiaal verdeeld met $n = 10$ en $p = 0,57$ 1
 - Beschrijven hoe $P(X \geq 7)$ en $P(Y \geq 7)$ met de GR kunnen worden berekend 1
 - $P(X \geq 7) \approx 0,0806$ 1
 - $P(Y \geq 7) \approx 0,3102$ 1
 - De kans dat een van de spelers minstens 7 keer wint, is ongeveer $0,0806 + 0,3102 \approx 0,39$ 1
- of
- $P(\text{K of L wint minstens 7 keer}) = P(\text{K wint minstens 7 keer}) + P(\text{K wint hoogstens 3 keer})$ 2
 - De gevraagde kans is $1 - (P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6))$, waarbij X binomiaal verdeeld is met $n = 10$ en $p = 0,43$ (of $p = 0,57$) 2
 - Beschrijven hoe deze kans met de GR berekend kan worden 1
 - De gevraagde kans is ongeveer 0,39 1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Dozen met vaste inhoud

- 13 maximumscore 6**
- De bodem is $15,0 - 2x$ bij $15,0 - 2x$ 1
 - De inhoud is $x(15,0 - 2x)^2$ 1
 - Beschrijven hoe de vergelijking $x(15,0 - 2x)^2 = 100$ opgelost kan worden 1
 - $x \approx 0,51$ of $x \approx 5,34$ 2
 - De lengte is ongeveer $15,0 + 15,0 - 0,51 \approx 29,5$ (dm) of ongeveer $15,0 + 15,0 - 5,34 \approx 24,7$ (dm) 1
- 14 maximumscore 3**
- De bodem is $b - 2x$ bij $b - 2x$ 1
 - De inhoud is $x(b - 2x)^2$ 1
 - Uit $x(b - 2x)^2 = 100$ volgt $(b - 2x)^2 = \frac{100}{x}$ 1
- 15 maximumscore 5**
- De lengte van de rechthoek is $2b - x$ 1
 - $A = b(2b - x)$ 1
 - $A = \left(2x + \frac{10}{\sqrt{x}}\right) \left(3x + \frac{20}{\sqrt{x}}\right)$ 1
 - Herleiden tot $A = 6x^2 + 70\sqrt{x} + \frac{200}{x}$ 2
- of
- $b = 2x + \frac{10}{\sqrt{x}}$, dus de breedte van de doos is $\frac{10}{\sqrt{x}}$ 2
 - $A = \left(2x + \frac{10}{\sqrt{x}}\right) \left(3x + \frac{20}{\sqrt{x}}\right)$ 1
 - Herleiden tot $A = 6x^2 + 70\sqrt{x} + \frac{200}{x}$ 2
- 16 maximumscore 4**
- Beschrijven hoe berekend kan worden voor welke waarde van x A minimaal is 1
 - $x \approx 2,02$ 1
 - De breedte van het karton is ongeveer 11,1 dm 1
 - De lengte van het karton is ongeveer 20,1 dm 1

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

File

17 maximumscore 6

- Het tijdstip van botsing is een oplossing van de vergelijking $300 + 0,40t^2 = 25t$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- De oplossing van de vergelijking is $t \approx 16,2$ (of $t \approx 46,3$) 1
- De snelheid van auto F is $s_F'(t) = 0,80t$ (of beschrijven hoe met de GR de snelheid van auto F op tijdstip $t \approx 16,2$ berekend kan worden) 1
- De snelheid van auto F op tijdstip $t \approx 16,2$ is ongeveer 13 (m/s) 1
- Het snelheidsverschil is dan ongeveer 12 (m/s) 1

18 maximumscore 4

- De grafiek van s_A raakt in het grensgeval aan de grafiek van s_F 1
- Beschrijven hoe (met de GR) de geschikte beginwaarde van de grafiek van s_A gevonden kan worden 2
- Het antwoord: minstens 400 (m) 1

of

- Op het moment van aansluiten geldt: $0,80t = 25$ 1
- Dit geeft $t = 31,25$ 1
- Voor de minimale afstand b geldt: $b + 0,40 \cdot 31,25^2 = 25 \cdot 31,25$ 1
- $b = 390,625$, dus de afstand moet minstens 400 (m) zijn 1

of

- De grafiek van s_A raakt in het grensgeval aan de grafiek van s_F (met $s_F(t) = b + 0,40t^2$) 1
- Van de vergelijking $0,40t^2 - 25t + b = 0$ is in dit geval de discriminant D gelijk aan 0 1
- $D = 625 - 1,60b$ 1
- $D = 0$ geeft $b = 390,625$, dus de afstand moet minstens 400 (m) zijn 1

Opmerking

Als het antwoord "minstens 390 (m)" is gegeven, hiervoor geen punten aftrekken.

5 Inzenden scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito.